

## אולימפיאדת המתמטיקה לנוער ע"ש פרופ' גיליס 1994

1.  $ABC$  הוא משולש נתון. הישר  $L$  עובר דרך  $C$  ומקביל ל- $AB$ . חוצה הזווית  $A$  פוגש את  $L$  ב- $E$  ואת הצלע  $CB$  ב- $D$ . חוצה הזווית  $B$  פוגש את  $L$  ב- $G$  ואת הצלע  $AC$  ב- $F$ . נתון כי  $DE = FG$ . הוכח כי המשולש שווה שוקיים.
2. נתונים שני מספרים טבעיות  $p$  ו- $q$ . נתונה פונקציה  $f$  המוגדרת עבור מספרים חיוביים ומקבלת ערכים חיוביים בלבד כך ש- $x^p y^q = f(xf(y))$ . הוכח כי  $f$  הוא רבוע שלם.
3. נתון צלעון בעל 1994 צלעות באורכים

$$a_i = \sqrt{4 + i^2}, \quad i = 1, 2, \dots, 1994.$$

הוכח שלא כל קודקודיו נמצאים על נקודות סריג (נקודות הון נקודות שעשויה הן מספרים שלמים).

4. מצא את הערך הקטן ביותר של מספר  $N$  כך שכל תת קבוצה של  $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$  בעלת  $N$  איברים מכילה סדרה חשבונית בעלת 11 איברים שונים.
5. נתון מספר טבעי  $a$  והם מספרים נתונים, שלא כולם 0.  $a_1, a_2, \dots, a_n$  הם מספרים ממשיים כך שלכל  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ממשיים מתקיים

$$r_1(x_1 - a_1) + \dots + r_n(x_n - a_n) \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} - \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}.$$

חשב את  $r_1, r_2, \dots, r_n$ .

6. נתון מספר טבעי  $1 < N$ . הוכח כי קיימת כפולה של  $N$  שאינה עולה על  $N^4$  שבכתייבתה בסיס 10 משתמשים ב-4 ספרות שונות לכל היותר.

7.  $ABC$  הוא משולש ישר זווית עם  $\angle C = 90^\circ$ .  $P$  ו- $Q$  הן נקודות על הצלעות  $AB$  ו- $CA$  או המשכיהן בהתאם, כך שמתקיים

$$\angle CQA = \angle CAB, \quad \angle CPB = \angle CBA.$$

8.  $ABC$  הוא משולש על  $BC$  ו- $AC$  בהתאם כך ש- $\angle ABR = \angle BAS = 90^\circ$ . מצא את  $\frac{CP}{AR} \cdot \frac{CQ}{BS}$  זווית המשולש  $ABC$  עבורו הבינו כי הוא מקסימלי וחשב מקסימום זה.