



53rd International Mathematical Olympiad
MAR DEL PLATA - ARGENTINA

Language: Chinese (Simplified)

Day: 1

2012年7月10日，星期二

1. 设 J 为三角形 ABC 顶点 A 所对旁切圆的圆心. 该旁切圆与边 BC 相切于点 M ，与直线 AB 和 AC 分别相切于点 K 和 L . 直线 LM 和 BJ 相交于点 F ，直线 KM 与 CJ 相交于点 G . 设 S 是直线 AF 和 BC 的交点， T 是直线 AG 和 BC 的交点.

证明： M 是线段 ST 的中点.

(三角形 ABC 的顶点 A 所对的旁切圆是指与边 BC 相切，并且与边 AB, AC 的延长线相切的圆.)

2. 设整数 $n \geq 3$ ，正实数 a_2, a_3, \dots, a_n 满足 $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. 证明：

$$(1+a_2)^2 (1+a_3)^3 \cdots (1+a_n)^n > n^n.$$

3. “欺诈猜数游戏”在两个玩家甲和乙之间进行，游戏依赖于两个甲和乙都知道的正整数 k 和 n .

游戏开始时甲先选定两个整数 x 和 N ， $1 \leq x \leq N$. 甲如实告诉乙 N 的值，但对 x 守口如瓶. 乙现在试图通过如下方式的提问来获得关于 x 的信息：每次提问，乙任选一个由若干正整数组成的集合 S （可以重复使用之前提问中使用过的集合），问甲“ x 是否属于 S ？”乙可以提任意数量的问题. 在乙每次提问之后，甲必须对乙的提问立刻回答“是”或“否”，甲可以说谎话，并且说谎的次数没有限制，唯一的限制是甲在任意连续 $k+1$ 次回答中至少有一次回答是真话.

在乙问完所有想问的问题之后，乙必须指出一个至多包含 n 个正整数的集合 X ，若 x 属于 X ，则乙获胜；否则甲获胜. 证明：

- (1) 若 $n \geq 2^k$ ，则乙可保证获胜；
(2) 对所有充分大的整数 k ，存在整数 $n \geq 1.99^k$ ，使得乙无法保证获胜.

Language: Chinese (Simplified)

考试时间：4小时30分
每题7分



53rd International Mathematical Olympiad
MAR DEL PLATA - ARGENTINA

Language: Chinese (Simplified)

Day: 2

2012年7月11日，星期三

4. 求所有的函数 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 使得对所有满足 $a+b+c=0$ 的整数 a, b, c , 都有

$$f(a)^2 + f(b)^2 + f(c)^2 = 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a).$$

(这里 \mathbb{Z} 表示整数集.)

5. 已知三角形 ABC 中, $\angle BCA = 90^\circ$, D 是过顶点 C 的高的垂足. 设 X 是线段 CD 内部的一点. K 是线段 AX 上一点, 使得 $BK = BC$. L 是线段 BX 上一点, 使得 $AL = AC$. 设 M 是 AL 与 BK 的交点. 证明: $MK = ML$.

6. 求所有的正整数 n , 使得存在非负整数 a_1, a_2, \dots, a_n , 满足

$$\frac{1}{2^{a_1}} + \frac{1}{2^{a_2}} + \dots + \frac{1}{2^{a_n}} = \frac{1}{3^{a_1}} + \frac{2}{3^{a_2}} + \dots + \frac{n}{3^{a_n}} = 1.$$

Language: Chinese (Simplified)

考试时间: 4 小时 30 分
每题 7 分